

ELÉBORO (*Helleborus foetidus*)

Es una planta perenne herbácea que alcanza 80 cm de altura y 100 cm de ancho, con tallo grueso y hojas brillantes perennes. Las flores en forma de taza de color verde amarillento, a menudo con los bordes púrpura en los cinco pétalos como sépalos en tallos erectos.

Hábitat de la especie

Es nativo de Europa occidental desde Inglaterra, Portugal y España hasta Alemania e Italia donde crece en zonas de montaña.

Especie de amplio espectro ecológico, característica de bosques más o menos húmedos (carrascales, quejigares, pinares, hayedos), pero que gusta también de sustratos removidos o pedregosos, y coloniza igualmente con frecuencia gleras, pedregales, lechos de ramblas y barrancos, taludes y cunetas, campos abandonados, desmontes, pastos pedregosos, siempre en ambientes con algo de frescor y humedad.

Distribución

Extendida por el W de Europa, con presencia puntual en el N de Marruecos. En la Península Ibérica abunda en el tercio septentrional y los sistemas montañosos, escaseando en la Depresión del Ebro, ambas Mesetas y el cuadrante SW. En Aragón es común en el Pirineo y el Sistema Ibérico, aunque rehuye las parameras, y apenas roza la Depresión del Ebro por los extremos NE y SE.

Paseo para su observación

- * [PASEO 1- COCHATÁ DE SAN CHUAN](#)
Circular de 2,5 km.

Nombres populares

Eléboro (fétido), culebrera, chibuerro, chiguarro, icharruego, flor de bruja, tetas de bruja, malcusit, marcusíns, matapullo, matarruego, oliarca, pan de broxas, pan de culebra, planta del veneno, pixacán, zatre. Agüerro (Camarillas).



¿Sabías que?

Su nombre popular se debe al uso que se hacía del jugo de la planta para envenenar las flechas.

Todas las partes de la planta son venenosas. La intoxicación produce vómitos y delirium tremens.

Si se ingiere puede llegar a ser mortal.



Ayuntamiento
Hoz de Jaca



Unión Europea
FEADER

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:
Europa Invierte en las zonas rurales

